

Белохвостая пигалица *Vanellochettusia leucura* в Северо-Восточном Прикаспии

А.С.Климов

Второе издание. Первая публикация в 1991*

В низовьях реки Урал, на разливах у посёлка Пешного, в 30 км южнее города Гурьева, 27 июня 1980 впервые встречена одиночная белохвостая пигалица *Vanellochettusia leucura* и ещё одна на речке Зарослой. Спустя три дня на разливах этой реки отмечена пара, в течение получаса настойчиво с криками летавшая вокруг наблюдателя. К сожалению, ни гнезда, ни птенцов найти не удалось. 3 июля птицы держались на том самом месте и их поведение не изменилось. 4 июля в 15 км на юго-восток от Гурьева мы встретили несколько десятков белохвостых пигалиц. Они бродили по отмелям на разливах вместе с турхтанами *Philomachus pugnax* и ходулочниками *Himantopus himantopus*. Рядом со взрослыми держались птенцы, отличавшиеся от родителей пёстрой раскраской. Они уже могли летать, но взлетали неохотно. У случайно добытой взрослой птицы в желудке обнаружили 3 крупные водные личинки жуков-плавунцов и раковину катушки.

Весной 1981 года белохвостые пигалицы прилетели, вероятно, в конце марта: 1 апреля несколько особей кормились на каналах у посёлков Акколь и Черепной. В начале июня 1981 года у посёлка Таскала, расположенного южнее города Гурьева, на старых залитых водой плантациях была обнаружена колония белохвостых пигалиц, занимавшая участок размером 150×50 м. Здесь были найдены 9 уже пустых гнёзд, выложенных сухой травой. Размеры гнёзд, см: наружный диаметр 26-30, диаметр лотка 6-9. Удалось поймать довольно большого птенца (длина крыла 100, длина плюсны 40, длина клюва 21 мм). Всё время до 7 взрослых птиц летали вокруг наблюдателя.

На мотоциклетном маршруте протяжённостью 4 км, проходящему по дамбе между двух каналов от посёлка Акколь к посёлку Черепному 2 июля 1981 учтено 17 белохвостых пигалиц, которые чаще взлетали парами и не отлетали далеко.

В мае 1982 года в 12 км восточнее города Гурьева на разливах и каналах встречалось довольно много белохвостых пигалиц. В одном месте удалось насчитать более 20 особей. В это же время найдено 8 гнёзд с яйцами. Все гнёзда располагались на лишённых растительного

* Климов А.С. 1991. Белохвостая пигалица в Северо-Восточном Прикаспии // Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 172-174.

покрова участках в небольших углублениях почвы диаметром 12-14 см. Выстилка в гнёздах почти отсутствовала. В 6 гнёздах было по 4 яйца, в 2 – 1 и 5. Размеры 14 яиц из 4 кладок, мм: 38.6-43.0×27.4-29.5, в среднем 40.7× 28.4. Масса яиц ($n = 9$): 13.6-16.4, в среднем 15.2 г. Птенцы вылупились со второй половины июня (с разницей в 10-15 дней внутри колонии). Вылупившиеся птенцы (масса 9.5-11.4 г) имеют светло-рыжеватую окраску верха спины и крыльев с довольно частыми чёрными пестринами. «Шапочка» такой же окраски, что и спина. Низ светлый, шея и брюшко почти белые. Поперёк груди проходит малозаметная свето-жёлтая полоса. Ноги длинные, серые, немного синеватые. Клюв чёрно-серый. По мере вылупления птенцов остатки скорлупы уносились из гнёзд взрослыми птицами.

Из 8 гнёзд, за которыми велось наблюдение, лишь в одном из 1 яйца не вылупился птенец. Интересно изменялось поведение взрослых: в начале насиживания яиц они просто отбегали или отлетали от гнёзд на 30-40 м в сторону и лишь отдельные из них поднимались с криками в воздух при появлении человека. Но по мере увеличения срока насиживания число взлетающих птиц росло, причём отдельные особи пытались даже прогнать от гнезда наблюдателя, пикируя на него.

В 1983 году белохвостые пигалицы появились в середине марта: более 10 птиц мы наблюдали 24 марта у посёлка Черепного. В июне белохвостые пигалицы также постоянно встречались на каналах у этого посёлка и у посёлка Акколь. Колония же у посёлка Таскала исчезла в связи с тем, что здесь в этом году разливов не было.

Кроме перечисленных встреч белохвостой пигалицы, в июне 1982 года на разливах реки Эмбы в урочище Айранколь зоолог Ф.А.Сараев обнаружил колонию из 5 пар, а в июне 1983 года в урочище Конуркудук – из 3-4 пар. Зоолог В.И.Трофимов встречал одиночную птицу в середине июля 1980 года у посёлка Карабау. По его сообщению, белохвостая пигалица наблюдалась им у города Гурьева начиная с его первого посещения этих мест в 1976 году. Видимо, около этого времени белохвостая пигалица и появилась здесь, так как ранее она в Северном Прикаспии не отмечалась (Долгушин 1962; Пославский 1965).

Литература

- Долгушин И.А. 1962. Отряд Кулики // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 2: 40-245.
Пославский А.Н. 1965. *Птицы Северного Прикаспия*. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Астрахань: 1-16.

